

SÉANCE DU 23 NOVEMBRE 1917

PRÉSIDENTENCE DE M. P.-A. DANGEARD.

Lecture est donnée du procès-verbal de la dernière séance, dont la rédaction est adoptée.

Par suite des présentations faites dans cette séance sont proclamés membres de la Société :

MM. LEMÉE (Albert), receveur à Mamers (Sarthe),
DELAFIELD (Mathurin L.), avenue Davel, 29, à
Lausanne (Suisse), présentés l'un et l'autre
par MM. Léveillé et Dangeard.

M. le Président annonce ensuite une nouvelle présentation.

Le Prince Bonaparte offre à la Société les fascicules 3 et 4 de ses *Notes ptéridologiques* et donne quelques explications à leur sujet.

M. F. Camus donne ensuite lecture des deux communications suivantes :

Note sur un *Carex* présumé hybride des *Carex acuta* et *paludosa*

PAR M. ÉMILE GADECEAU.

Au cours d'une herborisation faite le 10 juin dernier, en compagnie de notre confrère, M. Elie Cottereau, mon attention s'est portée sur un *Carex* dont le port me semblait celui du *C. acuta*, mais qui en différait, dès le premier examen, par la présence de trois stigmates au lieu de deux. Il croissait dans les prairies marécageuses au voisinage des *C. acuta* L. et *C. paludosa* Good., à Guéville, près Rambouillet.

Ce *Carex* est voisin de la plante décrite par M. Lambert,

comme *C. acuta* × *paludosa*, sous le nom de *C. auronensis*¹. Il en diffère cependant par un certain nombre de caractères, en particulier par la forme des utricules : je dirais que le *C. auronensis* tient davantage du *C. acuta* que du *C. paludosa*, tandis que la plante de Guéville montre la tendance contraire.

Si tant est qu'on doive nommer chacune de ces formes hybrides, qui semblent avoir la même origine, je propose, pour celle-ci, le nom de *C. Cottereaui*.

Un examen attentif, comparatif, avec les parents présumés, m'a permis de préciser dans le tableau ci-dessous les principaux caractères des quatre formes visées.

	<i>C. acuta</i> L.	<i>C. paludosa</i> Good.
<i>Épillets mâles</i> . . .	Linéaires, grêles.	Oblongs cylindriques, robustes.
<i>Épillets femelles</i> .	Linéaires-allongés, l'inférieur assez longuement pédonculé, ordinairement penchés, au moins l'inférieur; souvent mâles au sommet.	Cylindriques, denses, dressés, sessiles, l'inférieur courtement pédonculé.
<i>Utricules</i>	Petits, obovales, à bec presque nul.	Ovales-coniques, graduellement rétrécis en bec bifide, un peu allongé, rugueux sous la loupe.
<i>Stigmates</i>	Deux.	Trois.
	<i>C. auronensis</i> Lambert.	<i>C. Cottereaui</i> Nob.
<i>Épillets mâles</i> . . .	Cylindriques, étroits.	Oblongs-cylindriques, assez robustes.
<i>Épillets femelles</i> .	Sessiles, l'inférieur pédonculé, les supérieurs un peu étalés.	Sessiles, l'inférieur très courtement pédonculé, cylindriques, denses, dressés, mâles au sommet.
<i>Utricules</i>	Petits, à bec court, entier.	Assez gros, ovales, brusquement et nettement rétrécis en bec bifide assez court, rugueux sous la loupe.
<i>Stigmates</i>	Trois.	Trois.

1. Bulletin Académie de Géogr. botanique, Le Mans, 1908, p. 341.